

販売元：大正製薬(株)
製造販売元：ゲラク・ミスライン(株)

シガノンCQ1透明パッチ

禁煙補助剤

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

シガノンCQ1透明パッチ



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	シガノンCQ1透明パッチ
2	成分・分量	薬物貯蔵層100g 中 ニコチン 40g (シガノンCQ1透明パッチ：1枚中 ニコチン78mg)
3	用法・用量	胸、背中、腕のいずれかを選び、次の期間1日1回1枚を起床時に貼付し、就寝前にはがしてください。なお、貼付部位は毎日変えてください。 シガノンCQ1透明パッチ：最初の6週間 シガノンCQ2透明パッチ：次の2週間 ただし、シガノンCQ1透明パッチを6週間貼付後、禁煙時のイライラなどの症状がなくなり、禁煙継続に自信がある場合は、シガノンCQ2透明パッチを使用しなくてもよいです。
4	効能・効果	禁煙時のイライラ・集中困難・落ち着かないなどの症状の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために	1. 次の人は使用しないでください (1) 非喫煙者(たばこを吸ったことのない人及び現在たばこを吸っていない人)。 (2) 現在、他のニコチン製剤を使用している人。 (3) 妊婦、授乳婦又は妊娠していると思われる人。 (4) 重い心臓病を有する人。 1) 3ヵ月以内に心筋梗塞の発作を起こした人。 2) 重い狭心症と医師に診断された人。 3) 重い不整脈と医師に診断された人。 (5) 急性期脳血管障害(脳梗塞、脳出血等)と医師に診断された人。 (6) 本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (7) 肝・腎機能障害にて医療機関で医師の治療を受けている人。 (8) うつ病の既往のある人。 2. 次の部位には使用しないでください (1) 目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)等。 (2) やけど、吹出物、切り傷、炎症等皮ふに異常のある部位。 3. 本剤を使用中又は使用直後はたばこを吸ったり、ニコチンガムをかんだりしないでください 4. 1回に2枚以上貼らないでください 5. 本剤は次の状態のときに使用しないでください サウナ使用時、激しい運動時 6. 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人。・他の薬を使用している人。 ・高齢者又は20才未満の人。・本人又は家族がアレルギー体質の人。 ・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・絆創膏等にかぶれやすい人。・医師から次の診断を受けた人。心臓疾患〔心筋梗塞、狭心症、不整脈等〕、脳血管障害〔脳梗塞、脳出血等〕、末梢血管障害〔バージャー病等〕、高血圧、甲状腺機能亢進、褐色細胞腫、糖尿病〔インスリン製剤を使用している人〕、消化性潰瘍、肝・腎機能障害、全身性皮ふ疾患〔アトピー性皮ふ炎、湿疹性皮ふ炎等〕、てんかん、神経筋接合部疾患〔重症筋無力症、イートン・ランバート症候群〕・発熱している人。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。