

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	シガノンCQ2		
2	成分・分量	薬物貯蔵層 100g 中 ニコチン 40g (シガノン CQ2：1 枚中 ニコチン 36mg)		
3	用法・用量	胸、背中、腕のいずれかを選び、次の期間1日1回1枚を起床時に貼付し、就寝前にはがしてください。なお、貼付部位は毎日変えてください。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>シガノン CQ1：最初の6週間</td> <td>シガノン CQ2：次の2週間</td> </tr> </table> ただし、シガノン CQ1 を6週間貼付後、禁煙時のイライラなどの症状がなくなり、禁煙継続に自信がある場合は、シガノン CQ2 を使用しなくてもよいです。	シガノン CQ1：最初の6週間	シガノン CQ2：次の2週間
シガノン CQ1：最初の6週間	シガノン CQ2：次の2週間			
4	効能・効果	禁煙時のイライラ・集中困難・落ち着かないなどの症状の緩和		
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 次の人は使用しないでください <ol style="list-style-type: none"> (1) 非喫煙者(たばこを吸ったことのない人及び現在たばこを吸っていない人)。 (2) 現在、他のニコチン製剤を使用している人。 (3) 妊婦、授乳婦又は妊娠していると思われる人。 (4) 重い心臓病を有する人。 <ol style="list-style-type: none"> 1) 3ヵ月以内に心筋梗塞の発作を起こした人。 2) 重い狭心症と医師に診断された人。 3) 重い不整脈と医師に診断された人。 (5) 急性期脳血管障害(脳梗塞、脳出血等)と医師に診断された人。 (6) 本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (7) 肝・腎機能障害にて医療機関で医師の治療を受けている人。 (8) うつ病の既往のある人。 2. 次の部位には使用しないでください <ol style="list-style-type: none"> (1) 目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)等。 (2) やけど、吹出物、切り傷、炎症等皮ふに異常のある部位。 3. 本剤を使用中又は使用直後はたばこを吸ったり、ニコチンガムをかんだりしないでください 4. 1回に2枚以上貼らないでください 5. 本剤は次の状態のときに使用しないでください サウナ使用時、激しい運動時 6. 次に該当する人はお申し出ください <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人。・他の薬を使用している人。 ・高齢者又は20才未満の人。・本人又は家族がアレルギー体質の人。 ・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・絆創膏等にかぶれやすい人。 ・医師から心臓疾患〔心筋梗塞、狭心症、不整脈等〕、脳血管障害〔脳梗塞、脳出血等〕、末梢血管障害〔バージャー病等〕、高血圧、甲状腺機能亢進、褐色細胞腫、糖尿病〔インスリン製剤を使用している人〕、消化性潰瘍、肝・腎機能障害、全身性皮ふ疾患〔アトピー性皮ふ炎、湿疹性皮ふ炎等〕、てんかん、神経筋接合部疾患〔重症筋無力症、イートン・ランバート症候群〕の診断を受けた人。・発熱している人。 		
6	薬剤師が必要と判断する事項			

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談ください。